


Prefeitura Municipal de Queimados



ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES:

As páginas deste **caderno de questões** estão numeradas seqüencialmente e contêm 50 questões.

ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a paginação deste **caderno** está correta.
- 2 - Verifique no **cartão de respostas** se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo/área de atividade para o qual concorre estão corretos .
- 3 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 4 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de **4h (quatro horas)** para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranqüilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.

CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 03/09/2001 no Boletim Oficial de Queimados

Prazo de Recurso - 04 e 05/09/2001

Para encaminhamento de recurso deverá ser observado o disposto no **Título VII** do Edital que regulamenta o concurso (página 5 do Manual do Candidato).

Realização



Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro



GOVERNO
COMPROMISSO

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – O MEDO SOCIAL

Jurandir Freire Costa

No Rio de Janeiro, uma senhora dirigia seu automóvel com o filho ao lado. De repente foi assaltada por um adolescente, que a roubou, ameaçando cortar a garganta do garoto. Dias depois, a mesma senhora reconhece o assaltante na rua. Acelera o carro, atropela-o e mata-o, com a aprovação dos que presenciaram a cena. Verdíca ou não, a história é exemplar. Ilustra o que é a cultura da violência, a sua nova feição no Brasil.

Ela segue regras próprias. Ao expor as pessoas a constantes ataques à sua integridade física e moral, a violência começa a gerar expectativas, a fornecer padrões de respostas. Episódios truculentos e situações-limite passam a ser imaginados e repetidos com o fim de caucionar a idéia de que só a força resolve conflitos. A violência torna-se um item obrigatório na visão do mundo que nos é transmitida. Cria a convicção tácita de que o crime e a brutalidade são inevitáveis. O problema, então, é entender como chegamos a esse ponto. Como e por que estamos nos familiarizando com a violência, tornando-a nosso cotidiano.

Em primeiro lugar, é preciso que a violência se torne corriqueira para que a lei deixe de ser concebida como o instrumento de escolha na aplicação da justiça. Sua proliferação indiscriminada mostra que as leis perderam o valor normativo e os meios legais de coerção, a força que deveriam ter. Nesse vácuo, indivíduos e grupos passam a arbitrar o que é justo ou injusto, segundo decisões privadas, dissociadas de princípios éticos válidos para todos. O crime é, assim, relativizado em seu valor de infração. Os criminosos agem com consciências felizes. Não se julgam fora da lei ou da moral, pois conduzem-se de acordo com o que estipulam ser o preceito correto. A imoralidade da cultura da violência consiste justamente na disseminação de sistemas morais particularizados e irredutíveis a ideais comuns, condição prévia para que qualquer atitude criminosa possa ser justificada e legítima.

1 - “No Rio de Janeiro, uma senhora dirigia seu automóvel com o filho ao lado. De repente foi assaltada por um adolescente...”; a passagem do pretérito imperfeito para o pretérito perfeito marca a mudança de:

- a) um texto descritivo para um texto narrativo;
- b) a fala do narrador para a fala do personagem;
- c) um tempo passado para um tempo presente;
- d) um tempo presente para um tempo passado;
- e) a mudança de narrador.

2 - “De repente foi assaltada por um adolescente...”; esta frase, na voz passiva analítica, tem como correspondente na voz ativa a frase:

- a) De repente assaltou-se um adolescente;
- b) Um adolescente, de repente, assaltou (a senhora)...”;
- c) De repente, uma senhora foi assaltada...”;
- d) De repente, um adolescente assalta (uma senhora)...”;
- e) Um adolescente foi assaltado por uma senhora, de repente.

3 - “... que a roubou, ameaçando cortar a garganta do garoto.”; o bom uso do gerúndio requer que sua ação seja simultânea à do verbo principal, como ocorre nesse segmento do texto. Assim, é exemplo de mau uso do gerúndio a frase:

- a) O assaltante gritou, abrindo a porta...”;
- b) O motorista acovardou-se, abaixando o vidro;
- c) O assaltante entrou, sentando-se no banco traseiro;
- d) O marginal ameaçou-o, mostrando a arma;
- e) O motorista obedeceu, acelerando o carro.

4 - A narrativa contida no primeiro parágrafo tem a função textual de:

- a) exemplificar algo que vai ser explicitado depois;
- b) justificar a reação social contra a violência;
- c) despertar a atenção do leitor para o problema da violência;
- d) mostrar a violência nas grandes cidades;
- e) relatar algo que vai justificar uma reação social.

5 - Idéia **não** contida no texto é:

- a) a violência cria regras próprias;
- b) os criminosos agem segundo regras particulares;
- c) a violência aparece socialmente justificada;
- d) a violência aparece como algo inevitável;
- e) a violência requer uma ação governamental eficiente.

6 - Segundo o texto, para que a lei deixe de ser o remédio contra a violência é necessário:

- a) que as leis se tornem obsoletas;
- b) que os governos descuidem dos problemas;
- c) que a violência se banalize;
- d) que os marginais se tornam mais audaciosos;
- e) que a violência crie regras próprias.

7 - "Nesse vácuo, indivíduos e grupos passam a arbitrar o que é justo ou injusto..."; o comentário correto sobre esse segmento do texto é:

- a) O vácuo referido é o espaço vago deixado pela ação governamental;
- b) Indivíduos e grupos passam a tomar a lei em suas mãos;
- c) A justiça acaba sendo determinada pelos marginais;
- d) A injustiça acaba por elaborar as leis;
- e) Passa a vigorar a lei do mais esperto.

8 - "A imoralidade da cultura da violência consiste justamente na disseminação de sistemas morais particularizados e irredutíveis a ideais comuns..."; isso significa que:

- a) na cultura da violência todos os marginais pensam de forma semelhante;
- b) a imoralidade da cultura da violência se localiza em pequenos grupos;
- c) na cultura da violência todos saem perdendo;
- d) na cultura da violência, os ideais comuns inexistem;
- e) a violência dissemina ideais comuns irredutíveis.

9 - "O crime é, assim, relativizado em seu valor de infração."; uma forma de reescrever-se a mesma frase, mas com perda do sentido original é:

- a) O valor de infração do crime é, assim, relativizado;
- b) Assim, o crime foi relativizado em seu valor de infração;
- c) O crime tem seu valor de infração, assim, relativizado;
- d) Assim, o crime é, em seu valor de infração, relativizado;
- e) Relativiza-se, assim, o valor de infração do crime.

10 - O texto acima pode ser classificado, de forma mais adequada, como:

- a) narrativo moralizante;
- b) informativo didático;
- c) dissertativo opinativo;
- d) normativo regulamentador;
- e) dissertativo polêmico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

As questões de n.º 11 e 12 deverão ser respondidas a partir das normas preconizadas pelo Manual de Processamento de Artigos e Superfícies, do Ministério da Saúde.

11- O uso de luvas de borracha, enquanto equipamento de proteção individual específico, é indicado quando o trabalhador de enfermagem utiliza na esterilização de materiais o seguinte método:

- a) autoclave;
- b) álcool a 70%;
- c) estufa;
- d) glutaraldeído;
- e) água em ebulição.

12- A desinfecção de superfícies que entraram em contato com sangue de paciente portador do vírus HIV deve ser realizada com o seguinte produto:

- a) hipoclorito de sódio a 1%;
- b) água oxigenada a 10%;
- c) glutaraldeído a 1%;
- d) fenol a 5%;
- e) álcool a 70%.

13 - A soroterapia prescrita para um paciente constava de 500 mL de soro glicosado a 10%. Na enfermaria havia soro glicosado a 5% e ampolas de glicose hipertônica a 50%. O volume de soro glicosado a 5% e de glicose hipertônica a serem utilizados na preparação daquele soro são, respectivamente:

- a) 260 mL e 240 mL;
- b) 360 mL e 140 mL;
- c) 500 mL e 60 mL;
- d) 466 mL e 34 mL;
- e) 444 mL e 56 mL.

14 - Um paciente desidratado deve receber 500mL de soro fisiológico em 4 horas. Quantas gotas por minuto devem ser infundidas?

- a) 7 gts/min;
- b) 14gts/min;
- c) 42gts/min;
- d) 63gts/min;
- e) 125gts/min.

15 - Quantos mililitros de heparina deverão ser aspirados de um frasco de 5mL com 25.000 U/mL para administrar 7500 U/mL prescritas?

- a) 1,5 mL;
- b) 0,3 mL;
- c) 3 mL;
- d) 0,75 mL;
- e) 0,6 mL.

16 - Um médico prescreveu Penicilina Cristalina G Potássica 2.000.000 unidades para um paciente com infecção. No ambulatório dispunha-se de frascos de 500.000 unidades. Considerando-se que a via prescrita é a endovenosa, devem ser administrados:

- a) 20 mL;
- b) 40 mL;
- c) 10 mL;
- d) 4 mL;
- e) 2 mL.

17 - Hábitos alimentares, tensão emocional, uso de contraceptivos orais, tabagismo e atividade física, são informações importantes em uma primeira consulta de enfermagem, com vistas ao diagnóstico de:

- a) hipertensão arterial;
- b) câncer de útero;
- c) diabetes *mellitus*;
- d) doença pulmonar obstrutiva crônica;
- e) doenças pépticas;

18 - De acordo com Programa de Hipertensão Arterial do Ministério da Saúde, a população alvo deste programa está incluída na seguinte faixa etária:

- a) maior de 20 anos;
- b) menor de 20 anos;
- c) maior de 40 anos;
- d) maior de 50 anos;
- e) entre 40 e 60 anos.

19 - O quadro de tosse produtiva há mais de 4 semanas, acompanhada de febre e emagrecimento, requer do enfermeiro do posto de saúde a seguinte medida:

- a) baciloscopia;
- b) abreugrafia;
- c) PPD;
- d) raios X;
- e) broncoscopia.

20 - Uma paciente de 40 anos chegou ao ambulatório com um quadro de emagrecimento, irritação, tonteira, náuseas entre as refeições, infecções ginecológicas de repetição, aumento da frequência urinária e polidipsia. Estes sinais e sintomas são indicativos da seguinte doença:

- a) câncer de colo de útero;
- b) AIDS;
- c) diabetes *mellitus*;
- d) gravidez;
- e) cistite.

21 - O Programa de Saúde da Família apresenta uma concepção de saúde que tem como objetivo a promoção da qualidade de vida. Assinale a alternativa que caracteriza este Programa:

- a) organiza suas ações sob a forma de programas verticais e grandes campanhas de prevenção dirigidas às famílias;
- b) visa à expansão da rede de hospitais e de procedimentos capazes de atender à crescente demanda por saúde;
- c) adota o modelo assistencial sanitário que tem como porta de entrada o tradicional centro de saúde;
- d) desenvolve as práticas de saúde que integram ações individuais e coletivas centradas na família e na comunidade;
- e) reserva para o enfermeiro, que participa da equipe de saúde da família, a execução dos procedimentos clínicos e a identificação dos processos patológicos agudos.

22 - Um paciente apresenta um quadro de manchas hipocrômicas, áreas de anestesia e rarefação de pelos. Estes sinais são indicativos da seguinte patologia:

- a) psoríase;
- b) hanseníase;
- c) dermatite;
- d) micose;
- e) vitiligo.

23 - As medidas de prevenção e controle da tuberculose incluem o isolamento do paciente bacilífero, através das seguintes medidas:

- a) isolamento protetor;
- b) precauções com secreções;
- c) precauções com sangue;
- d) isolamento respiratório;
- e) isolamento total.

24 - A hanseníase requer tratamento medicamentoso prolongado sob controle do serviço de saúde. O esquema padrão preconizado pelo Ministério da Saúde para os pacientes paucibacilares inclui os seguintes medicamentos:

- a) rifampicina e clofazimina;
- b) clofazimina e propanolol;
- c) dapsona e rifampicina;
- d) propanolol e dapsona;
- e) clofazimina e dapsona.

25 - O saneamento básico é uma importante medida de prevenção e controle de doenças transmissíveis, como:

- a) dengue e poliomielite;
- b) hepatite B e cólera;
- c) tuberculose e gastroenterite;
- d) meningite C e AIDS;
- e) verminose e hepatite A.

26 - O enfermeiro de um setor de saúde ocupacional deve orientar os trabalhadores que cuidam da limpeza de bueiros e esgotos a usarem botas e luvas para se protegerem, evitando a seguinte patologia:

- a) verminose;
- b) hepatite;
- c) raiva;
- d) leishmaniose;
- e) leptospirose.

27- Após um acidente, um paciente grande queimado dá entrada no serviço de emergência. Assinale que medida prioritária deve ser adotada imediatamente:

- a) antibioticoterapia;
- b) profilaxia tetânica;
- c) reposição hidroeletrólítica;
- d) curativo das queimaduras;
- e) banho próprio para queimados.

28 - O enfermeiro deve orientar as mulheres que o hábito de fumar, história de DST e multiplicidade de parceiros são fatores de risco para a seguinte patologia:

- a) AIDS;
- b) câncer de mama;
- c) abortos espontâneos;
- d) câncer cérvico-uterino;
- e) câncer de pulmão.

29 - O enfermeiro deve identificar os fatores de risco a fim de prevenir o adocimento e as complicações. Uma história pregressa de parto prematuro, abortamentos e feto macrossômico são indicativos da seguinte patologia:

- a) anemia ferropriva;
- b) diabetes *Mellitus*;
- c) mola Hidatiforme;
- d) mioma;
- e) deslocamento de placenta prévia.

30 - Os métodos anticoncepcionais Billings, Temperatura Corporal Basal e Ogino-Knaus são classificados como:

- a) dispositivos intra-uterinos;
- b) métodos de barreira;
- c) contraceptivos hormonais;
- d) métodos definitivos;
- e) métodos naturais.

31 - O esquema básico de vacinação adotado para o Estado do Rio de Janeiro, para crianças de 0 a 7 anos, é:

- a) anti-pólio, anti-sarampo, tríplice(DPT), anti-meningite C, BCG, tríplice viral;
- b) raiva humana, BCG, anti-hepatite B, dupla(dT), BCG, anti-pólio;
- c) anti-pólio, tríplice(DPT), anti-hepatite B, anti-sarampo, BCG, H. *influenzae* tipo b, tríplice viral;
- d) antitetânica, anti-pólio, anti-diftérica, BCG, anti-sarampo, tríplice viral, anti-hepatite B;
- e) anti-sarampo, tríplice, anti-pólio, BCG, anti-caxumba.

32- As atividades profissionais consideradas insalubres, que conferem o direito ao adicional de insalubridade são aquelas que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o trabalhador de saúde a agentes nocivos, tais como:

- a) inflamáveis;
- b) radiações ionizantes;
- c) explosivos;
- d) eletricidade;
- e) biológicos.

33 - As medidas de proteção previstas pela legislação para trabalhador de saúde preconizam o uso de gorros, máscaras, luvas, aventais especiais, etc, adequados a cada situação de risco. Estes equipamentos são denominados:

- a) CIPA;
- b) SIPAT;
- c) NRT;
- d) EPI;
- e) CLT.

34- O ambiente de trabalho pode se constituir em fator de risco para o trabalhador. Relacione o tipo de risco com suas conseqüências:

Risco	Conseqüências
() biológico	1- câncer, alterações celulares, surdez
() químico	2- irritação das vias aéreas, náuseas, dor de cabeça
() físico	3- hepatite, leptospirose, tétano
() ergonômetro	4- cansaço, doenças da coluna, dor muscular
() mecânico	5- acidentes graves, queimaduras, choque elétrico

A resposta correta é:

- a) 3, 2, 1, 4, 5;
- b) 5, 1, 2, 3, 4;
- c) 2, 3, 1, 5, 4;
- d) 1, 2, 3, 4, 5;
- e) 4, 3, 5, 2, 1.

35 - Assinale a alternativa que apresenta o conceito de saúde estabelecido pela Lei Orgânica da Saúde:

- a) "Saúde é resultante de políticas econômicas e sociais que visem a redução de doenças e o acesso às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde".
- b) "Saúde é resultante de um equilíbrio dinâmico entre o homem, o agente patogênico e o meio".
- c) "Saúde é resultante de uma assistência sem risco e de qualidade, oferecidas em unidades de saúde que tenham passado por avaliações de Acreditação Hospitalar".
- d) "Saúde é um estado de completo bem estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças".
- e) "Saúde é resultante de boa alimentação e de higiene".

36 - A reforma psiquiátrica apresenta uma nova visão do portador de transtornos mentais. Analise as condutas a seguir e marque aquela que o enfermeiro deve adotar em uma relação terapêutica de ajuda:

- a) diante de um paciente ansioso, que solicita a enfermagem a todo momento e apresenta medos infundados: - *Abordar o paciente dizendo que seus medos são irreais, que ele tem que enfrentá-los e só ocupar a enfermagem quando necessário;*
- b) diante de um paciente ansioso, que não dorme e apresenta medos e pesadelos: - *Orientar o paciente afirmando que todo mundo tem medo, que ele não deve se impressionar, mas tomar um copo de leite quente e dormir ;*
- c) na emergência psiquiátrica, ao atender um jovem deprimido que tomou 15 comprimidos de Diazepam: - *Afirmar que ele não queria mesmo morrer, que deixe de assustar seus pais pois quem quer morrer dá um tiro na cabeça;*
- d) na emergência psiquiátrica, ao atender uma mulher deprimida que cortou os pulsos: - *Perguntar porque ela desejou morrer, não julgar sua atitude e evitar deixá-la sozinha no setor;*
- e) na enfermaria psiquiátrica diante de um paciente agitado que anda e fala sem parar o dia todo: - *Contê-lo no leito para que ele se acalme.*

37 - O Código de Ética de Enfermagem estabelece a obrigatoriedade do sigilo profissional, exceto diante dos casos previstos em lei (art.29, capítulo IV). Em qual das situações abaixo o sigilo **não** pode ser quebrado:

- a) Em caso de sevícias de menores;
- b) Ao tomar conhecimento da internação de um criminoso;
- c) Quando o sigilo põe em risco a vida de uma terceira pessoa;
- d) Na declaração de doenças infecto-contagiosas na notificação compulsória;
- e) Quando um adulto for drogado e seus pais e amigos não sabem.

38 - Gerenciar uma unidade de internação tem sido um desafio para o enfermeiro, principalmente no que diz respeito ao exercício da liderança. Assinale o conceito contemporâneo de liderança, que promova a integração e a interação do grupo e garanta a qualidade do trabalho em enfermagem:

- a) Liderar é exercer o poder de influenciar as pessoas, levando-as a alcançar as metas organizacionais e, conseqüentemente, a obtenção da qualidade.
- b) Liderar é motivar o grupo a alcançar os objetivos propostos pelo líder, incentivando-o a formar uma visão crítica da realidade social .
- c) Liderar é promover a autonomia do grupo de forma não dirigida ou dirigida quando requerida por ele, visando à mudança de comportamentos.
- d) Liderar é estabelecer relações de interação e participação entre pessoas, de forma a promover a ação crítica, reflexiva, criativa, inovadora e transformadora da realidade.
- e) Liderar é usar as funções administrativas para estimular a visão crítica, reflexiva e a mudança de valores, levando o grupo a mudar a realidade.

39 - Assinale a alternativa que indica o conceito que melhor define **planejamento** nas atividades de enfermagem:

- a) O planejamento garante a racionalização das ações dividindo-as por atividades entre os membros da equipe de enfermagem.
- b) O planejamento garante o cuidado personalizado, elevando o seu padrão.
- c) O planejamento em bases científicas valoriza a assistência de enfermagem, além de garantir o cumprimento das ordens médicas.
- d) O planejamento garante o cumprimento da Lei do Exercício Profissional e confere ao enfermeiro o mesmo *status* que tem o médico.
- e) O planejamento garante o cuidado individualizado em bases científicas, orienta as ações e a avaliação da assistência prestada pela enfermagem.

40 - O Programa de Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento de uma Criança deve ser feito, de forma sistematizada, até que ela complete:

- a) 6 meses;
- b) 1 ano;
- c) 5 anos;
- d) 3 anos;
- e) 10 anos.

41 - Os procedimentos por meio dos quais as vacinas são conservadas em condições adequadas de refrigeração para que possam conservar sua potência, são denominados cadeia de frio. É responsabilidade do enfermeiro mantê-la de acordo com as normas técnicas.

Analise as afirmativas a seguir:

- 1-O espaço livre do congelador deve ser preenchido por sacos plásticos cheios de gelo; os sacos devem manter uma distância mínima entre eles para não interromper a circulação do ar frio.
- 2-O termômetro indica a temperatura em que estão as vacinas; a temperatura deve estar entre 0º e 6º C.
- 3- A temperatura interna do congelador deve ser verificada duas vezes por dia.
- 4-Os frascos de diferentes vacinas podem ser colocados juntos, na mesma bandeja, desde que sejam conservados secos para não perder os rótulos.
- 5-As vacinas devem ser colocadas nas estantes centrais e na porta do refrigerador.

Estão correta(s) a(s) afirmativas:

- a) 1 e 4;
- b) 2 e 5;
- c) 1 e 2;
- d) 1 e 3;
- e) 3 e 4.

42- A escolha do curativo e o tipo de cobertura dependem do tipo de ferida e o estágio em que ela se encontra. Assinale a afirmativa que indica a escolha correta:

- a) os anti-sépticos recomendados para matar microorganismos em feridas infectadas são o hexaclorofeno, a água oxigenada, o éter e o PVP-I tópico;
- b) a papaína é uma enzima proteolítica indicada para limpeza de secreções, de tecido necrótico e pus , facilitando a cicatrização de feridas;
- c) as coberturas de hidrocolóides são indicadas para feridas com forte exsudação;
- d) o Hidrogel proporciona ambiente úmido oclusivo favorável à cicatrização, aliviando a dor e é indicado para feridas infectadas;
- e) os filmes são um tipo de cobertura de poliuretano, que têm grande capacidade de absorção e são indicados para feridas infectadas.

43 - O Método Canguru é um tipo de assistência eficiente e de baixo custo que vem sendo adotado na atenção ao recém-nascido.

Analise as afirmativas a seguir:

- I - O método respeita a livre escolha da família;
- II - Inclui todos os bebês desde que sejam prematuros;
- III - Permite o contato entre a mãe e o bebê desde a admissão na Unidade Neonatal;
- IV - Permite o contato pele a pele entre a mãe e o bebê, pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso.

As afirmativas que indicam procedimentos corretos do Método Canguru são:

- a) I e II;
- b) I e III;
- c) II e III;
- d) I, II e III;
- e) I, III e IV.

44 - Na 2ª etapa do Método Canguru , mãe e bebê devem ficar alojados na enfermaria.

Analise as afirmativas a seguir e identifique os critérios para elegibilidade dos bebês:

- I- Estabilidade respiratória, peso mínimo de 1800g., nutrição enteral por gavage;
- II- Peso mínimo de 1800g., nutrição parenteral, ganho de peso diário maior que 20 g;
- III- Estabilidade clínica, nutrição enteral plena, peso mínimo de 1250 g., ganho de peso diário maior que 15g.

Assinale:

- a) se apenas I está correta;
- b) se apenas II está correta;
- c) se apenas III está correta;
- d) se apenas I e III estão corretas;
- e) se apenas II e III estão corretas.

45- No primeiro ano de vida o crescimento de um bebê é muito rápido, principalmente durante os 6 primeiros meses. Em decorrência, a cada mês, o lactente:

- a) ganha em média 1200g, a altura aumenta em torno de 4,0 cm. e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 0,5 cm;
- b) ganha em média 680g, a altura aumenta em torno de 2,5 cm e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 1,5 cm;
- c) ganha em média 2000g, a altura aumenta em torno de 1,0 cm e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 3,0 cm;
- d) ganha em média 400g por mês ,a altura aumenta em torno de 4,0 cm por mês e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 0,5 cm;
- e) ganha em média 2500g, a altura aumenta em torno de 3,0 cm e o perímetro cefálico aumenta aproximadamente 3,5 cm.

46 - O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de uma criança envolve ações de saúde que visam, dentro de um calendário mínimo de observações, avaliar e assistir este processo.

Em todos os comparecimentos da criança às Unidades de Saúde deve-se:

- I- incluí-la nos programa de suplementação alimentar;
- II- verificar o esquema de vacinação;
- III- promover o aleitamento materno e a orientação alimentar;
- IV- desenvolver atividades de educação para a saúde, com destaque para o desmame precoce.

A alternativa que indica os procedimentos corretos é:

- a) I e III
- b) II e III
- c) II e IV
- d) I, III e IV
- e) I, II, III e IV

47- A avaliação da glicosúria é uma técnica muito adotada pela enfermagem. Ela exige uma indicação precisa.

Assinale a alternativa que indica quando ela deve ser adotada:

- a) a glicosúria é um método seguro para identificar hiperglicemia e hipoglicemia em clientes portadores de Diabetes *Mellitus*;
- b) a glicosúria é um método adequado para realizar diagnóstico de Diabetes *Mellitus* em clientes acima de 40 anos;
- c) a glicosúria é um método ideal para monitorização do tratamento do Diabetes *Mellitus*;
- d) a glicosúria é um método adotado para monitorização do tratamento do Diabetes *Mellitus*, quando não é possível realizar a glicemia capilar;
- e) a glicosúria é um método para identificar hiperglicemia e corpos cetônicos.

48 - A gravidez e o parto em adolescentes estão associados a altas taxas de morbidade e de mortalidade. Os programas que visem à saúde reprodutiva deste segmento devem ser capazes de indicar os métodos contraceptivos mais adequados. Os métodos contraceptivos mais indicados para adolescentes são:

- a) preservativo masculino e contraceptivos orais;
- b) preservativo feminino e preservativo masculino;
- c) método de Billings e método da tabela;
- d) preservativo masculino e dispositivo intrauterino (D.I.U.);
- e) preservativo feminino e diafragma.

49 - A verificação da ausculta dos batimentos cardio-fetais (bcf), realizada com estetoscópio de Pinard, requer do profissional de saúde procedimentos que viabilizem a execução correta do exame.

Analise os passos a seguir:

- 1- controlar o pulso da gestante;
- 2- descobrir o abdome;
- 3- posicionar a gestante em decúbito dorsal;
- 4- identificar o dorso fetal pela palpação;
- 5- pressionar levemente, com a cabeça o estetoscópio sobre o local correspondente ao dorso fetal;
- 6- procurar o ponto de melhor ausculta do BCF;
- 7- segurar o estetoscópio de Pinard pelo tubo;
- 8- contar o BCF;
- 9- registrar os dados obtidos.

A ordem seqüencial correta é:

- a) 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 8 e 9;
- b) 2, 1, 3, 7, 5, 4, 6, 8 e 9;
- c) 3, 1, 9, 2, 6, 5, 4, 7 e 8;
- d) 3, 2, 4, 1, 7, 5, 6, 8 e 9;
- e) 3, 2, 4, 7, 5, 6, 1, 8 e 9.

50 - O enfermeiro que atua em um Centro Obstétrico, deve reconhecer as características que indicam que a gestante encontra-se em trabalho de parto e quais são os procedimentos a serem adotados.

Leia as proposições a seguir:

- 1- respiração mais facilitada, o aumento da lordose e das secreções das glândulas cervicais caracterizam o período premonitório do parto;
- 2- o diagnóstico do trabalho de parto em primíparas é feito quando o colo encontra-se semi-apagado, dilatado para 3cm e no mínimo quatro contrações em 60 segundos;
- 3- o 3º período clínico do parto inicia-se com a dilatação completa do colo e encerra-se com a saída do feto;
- 4- a amniotomia está contra-indicada em caso de parturiente HIV positivo.

Estão corretas:

- a) 1, 2, 3 e 4;
- b) 2,3 e 4;
- c) 2 e 4;
- d) 1 e 4;
- e) 1 e 3.

