



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

MÉDICO RADIOLOGISTA

INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas sequencialmente e contêm 50 questões.

ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.


CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.



Realização

Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1 - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

2 - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

3 - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

4 - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

5 - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

6 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

7 - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

8 - A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

9 - O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

10 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

MÉDICO RADIOLOGISTA

11 - Numa radiografia em pá do tórax em ortostática, podemos suspeitar de derrame subpulmonar quando observamos:

- a) retração do mediastino
- b) elevação da cúpula frênica
- c) velamento total do hemitórax
- d) velamento do seio costofrênico

12 - A seqüestração broncopulmonar tem como característica:

- a) ser cística
- b) ser intralobar
- c) ser extralobar
- d) ter suprimento sanguíneo de vaso próprio aórtico

13 - O local mais freqüente de localização de corpo estranho na árvore brônquica é:

- a) língua
- b) lobo médio
- c) lobo inferior direito
- d) lobo superior esquerdo

14 - O tumor pulmonar que costuma apresentar calcificações é o:

- a) leiomioma
- b) hamartoma
- c) mesotelioma
- d) carcinoma de células alveolares

15 - Lesões ósseas expansivas e pulsáteis são causadas por metástases de carcinoma de:

- a) mama e rim
- b) tireóide e rim
- c) cólon e pulmão
- d) mama e tireóide

16 - São causas de rarefação da lâmina dura dentária:

- a) hiperparatireoidismo, osteomalácia, doença de Paget
- b) hiperparatireoidismo, adamantinoma, cisto folicular
- c) cisto folicular, doença de Paget, granuloma apical
- d) cisto radicular, lues, hipotireoidismo

17 - Espondilólise com espondilolístese ocorre por lesão:

- a) no istmo interapofisário
- b) no processo transverso
- c) no pedículo
- d) na lâmina

18 - As alterações mais precoces de espondilite na coluna vertebral são:

- a) osteoporose e calcificação ligamentosa
- b) osteoporose e anquilose das articulações interapofisárias
- c) esclerose interapofisária e coluna com aspecto de “bambu”
- d) perda da concavidade do bordo anterior do corpo vertebral e aumento da densidade óssea no “canto” das vértebras

19 - O tarso é formado pelos seguintes ossos:

- a) escafóide, cubóide, piramidal e astrágalo
- b) cubóide, astrágalo, piramidal e escafóide
- c) astrágalo, calcâneo, escafóide e cuneiforme
- d) sesamóide, cuneiforme, piramidal e calcâneo

20 - Nos ossos longos, a localização epifisária (após parada de crescimento ósseo) é própria do:

- a) tumor de células gigantes
- b) cisto ósseo aneurismático
- c) osteossarcoma
- d) geodo

21 - Na síndrome de Peutz-Jeghers, a lesão polipóide corresponde patologicamente à seguinte lesão:

- a) hiperplásica
- b) adenomatosa
- c) granulomatosa
- d) hamartomatosa

22 - No estudo radiológico do abdômen agudo, a presença do sinal de Rigler indica:

- a) íleo biliar
- b) apendicite aguda
- c) obstrução intestinal
- d) perfuração de úlcera oca

23 - Nas formas mais graves de estrengiloidíase, observamos:

- a) estenose duodenal e tumefação mesentérica
- b) aspecto tubular e liso do jejuno proximal
- c) ulcerações marginais no cólon
- d) polipose do intestino delgado

24 - São alterações radiológicas mais sugestivas de tuberculose entérica:

- a) sinal de Stierling, ulcerações irregulares no íleo terminal e ausência de fístulas
- b) ulcerações do íleo terminal, ceco normal e presença de fístulas
- c) aspecto em mosaico do íleo terminal, fístulas e ulcerações
- d) dilatação do ceco, sinal de salto e sinal de Stierling

25 - O diagnóstico de hipertensão arterial de origem renovascular pode ser obtido através de:

- a) urografia com sonografia
- b) urografia e ultra-sonografia
- c) urografia com wash-out
- d) cisto uretrografia de esforço

26 - No carcinoma do rim, a exclusão funcional na realização da urografia é consequência da:

- a) invasão da pelve renal
- b) obstrução da veia renal
- c) obstrução do ureter
- d) invasão do ureter

27 - São causas de diminuição do tamanho renal:

- a) hipoplasia renal, obstrução arterial e glomerulonefrite crônica
- b) pielonefrite xantogranulomatosa, amiloidose, tuberculose
- c) amiloidose, ureterite cística, pielonefrite crônica
- d) leucemia, linfoma, pielonefrite crônica

28 - Numa criança, a obstrução urinária vesicouretral, determinada por massa pélvica, leva à suposição da seguinte patologia:

- a) teratoma
- b) válvula uretral
- c) neuroblastoma
- d) sarcoma botrióide

29 - Aniridia é um sinal que acompanha frequentemente a seguinte patologia:

- a) hamartoma renal
- b) tumor de Wilms
- c) tumor de Ewing
- d) pielonefrite xantogranulomatosa

30 - A incidência de Reverchon é usada para melhor avaliar a seguinte estrutura óssea:

- a) buraco de conjugação
- b) seio esfenoidal
- c) osso occipital
- d) buraco ótico

31 - A obstrução da via aérea superior, na síndrome de Pierre Robin, é devida à:

- a) hipertrofia das adenóides
- b) hipoplasia da mandíbula
- c) abertura do palato
- d) glossoptose

32 - Durante a realização de uma ultra-sonografia, o elemento que pode ser considerado “janela acústica” é:

- a) interface do fígado
- b) interface da costela
- c) interface de tecido-ar
- d) interface de tecido-osso

33 - Os segmentos hepáticos são definidos pelas seguintes veias hepáticas:

- a) direita e esquerda
- b) lateral, média e direita
- c) direita, esquerda e média
- d) direita, esquerda, média e lateral

34 - O corpo do pâncreas está em contato na sua superfície anterior com:

- a) dorso do estômago
- b) artéria esplênica
- c) grande epíplon
- d) veia esplênica

35 - A veia cava inferior aumenta de diâmetro acima da confluência da:

- a) veia renal
- b) veia porta
- c) veia esplênica
- d) veia mesentérica superior

36 - O saco gestacional geralmente corresponde a uma gravidez, em semanas, de:

- a) menos de 2
- b) entre 4 e 10
- c) entre 10 e 15
- d) entre 16 e 36

37 - A ultra-sonografia mamária não é específica para avaliação de:

- a) lesões palpáveis em mulheres jovens
- b) nódulos detectados à mamografia
- c) mama com prótese
- d) microcalcificações

38 - O ovário adulto mede cerca de:

- a) 3 x 2 x 1 cm
- b) 3 x 2 x 2 cm
- c) 4 x 3 x 3 cm
- d) 4 x 4 x 4 cm

39 - A ultra-sonografia transvaginal detecta as estruturas do embrião, em relação à realização da ultra-sonografia abdominal, cerca de:

- a) 1 semana antes
- b) 2 semanas antes
- c) 5 semanas antes
- d) 7 semanas antes

40 - Ao se reduzir o feixe de raio X através de cones, cilindros e diafragmas, devemos:

- a) acrescentar o kv ou mAs para compensar a restrição à radiação primária e secundária
- b) diminuir o kv e aumentar o mAs
- c) aumentar o tempo de exposição
- d) diminuir o kv e o mAs

41 - O aumento que se deve fazer em kv, para se obter um resultado apreciável na densidade de um exame radiológico, é:

- a) 1 kv
- b) 2 kv
- c) 3 kv
- d) 8 kv

42 - A incidência de Chassard-Lapiné e suas variantes no exame do cólon tem por objetivo:

- a) pesquisar pólipos
- b) pesquisar pólipos e divertículos
- c) estudar os ângulos hepático e esplênico
- d) desdobrar as alças formadas pela sigmóide, evitando superposições

43 - A técnica de A. Von Rosen, para avaliação de luxação congênita do quadril, consiste em radiografar a bacia:

- a) com o paciente em posição de rã
- b) em ortostática com adução das coxas
- c) em AP com abdução das coxas de 45°
- d) com rotação externa dos membros inferiores

44 - A porcentagem de energia dos elétrons que é convertida em calor num tubo de raio X, operando com 100 kvp e alvo de tungstênio, corresponde a:

- a) 97 %
- b) 97,5 %
- c) 98 %
- d) 99 %

45 - NÃO se considera agente etiológico de necrose asséptica:

- a) trauma
- b) corticosteróide
- c) dermatomiosite
- d) lúpus eritematoso

46 - A dosagem de fosfatase alcalina é normal na seguinte patologia:

- a) escorbuto
- b) raquitismo
- c) osteoporose
- d) doença de Paget

47 - A causa mais freqüente de lesão osteolítica craniana em criança é:

- a) leucemia
- b) metástase
- c) histiocitose
- d) tumor primitivo

48 - Na síndrome de Plummer-Vinson ocorre:

- a) presbiefôago
- b) anemia e glossite
- c) hematêmese e melena
- d) esclerose alongada do esôfago

49 - Nos casos de megaesôfago, a bolha gástrica se apresenta mais freqüentemente:

- a) normal
- b) ausente
- c) aumentada
- d) com contorno irregular

50 - A úlcera pós-bulbar geralmente está associada à síndrome de:

- a) Mallory-Weiss
- b) Peutz-Jeghers
- c) Zollinger-Ellison
- d) Gardner